

Инструкции по сбору образца мокроты

1. Для лаборатории: отметить (обвести вокруг) назначенный анализ

2. Для больного:

- На каждом контейнере написать свое имя и фамилию, дату и время сбора.
- Прополоскать водой рот или горло перед сбором мокроты.
- Собрать в стерильный контейнер мокроту от первого глубокого откашливания утром. Откашляйте отделения из легких, вызывая у себя глубокий кашель, вместо того, чтобы собирать слюну изо рта. Если вам трудно это сделать, то обсудите с врачом, как по-другому можно получить нужный образец.
- Собирать нужно только по одному образцу в сутки.

Название теста	Тест / Код	Контейнер	Примечания
Бактериологический анализ мокроты, окрашивание (обычная бактериальная проба)	6561/SPU	Стерильный флакон (с завинчивающейся крышкой)	Оптимально, если доставить в лабораторию в течение 2 часов. Можно держать при комнатной температуре и доставить в течение 24 часов, если невозможно было привести раньше. Собирать только по одному образцу в день. Лаборатория проверит пригодность на обычную бактериальную пробу
Проба на кислотоустойчивые бактерии (мазок на кислотоустойчивые бактерии и проба на микобактерии/ возбудитель туберкулеза)	6617/AFC	Стерильный флакон (с завинчивающейся крышкой)	Поставить в холодильник. Собирать только по одному образцу в день. Если нужно собрать несколько образцов в течение нескольких дней, то каждый образец собирайте в отдельный флакон. Напишите дату и время сбора на каждом флаконе. Все флаконы с пробями можно поставить в холодильник и доставить в лабораторию все вместе. Рекомендуется: собрать всего 3 пробы рано утром в разные дни, как предписано врачом.
Проба на патогенные грибы	6579/FUN	Стерильный флакон (с завинчивающейся крышкой)	Поставить в холодильник и доставить в течение 2-х дней. Собирать только по одному образцу в день.

Грибы/пневмоцисты, окрашивание образца	6301 (цитологическое отделение)	Стерильный флакон (с завинчивающейся крышкой)	Поставить в холодильник и доставить в течение 2-х дней. Собирать только по одному образцу в день.
Мокрота для цитологического исследования	6301 (цитологическое отделение)	Пробирка с фиксатором CytoLyte	Если этот же образец предназначен и для микробиологического исследования, НЕ используйте фиксатор CytoLyte™. Собрать образец в стерильный контейнер и отправить в лабораторию. Не ставить в холодильник. Для надлежащего исследования желательно собрать по одной пробе рано утром в течение трех дней подряд.
